

دازيد dazide

ENHANCE

حببيبات تذوب في الماء WSG

منظم نمو نباتي يستعمل للحصول على نباتات زينة وازهار قطف عالية الجودة مكثرة وقوية

تحذيرات:

- يجب الالتزام بمعدلات الاستعمال المذكورة على الملصقة.
- يجب أن لا يزيد عدد الرشوات عن رشتين خلال الموسم الواحد.
- يخزن في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان مأمون وجاف بعيداً عن الأطفلة والمشروبات والأعلاف ويميداً عن تناول الأطفال.
- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء الاستعمال.
- يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء الاستعمال.
- يجب غسل الجلد والعيون بالماء في حال الملامسة.
- تجنب استنشاق رذاذ الرش.
- يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الاستعمال.
- يجب عدم تلوث المياه السطحية بالمواد الكيماوية أو العوالت الفارغة.
- عدم التخزين في عبوات معدنية.

الوكلاء والموزعون:

الشركة الأردنية للزراعة والتجارة نجيب
Najib Agricultural & Trading Co. Ltd.
عمان - الأردن

هاتف: ٤١٢٨١٣٦ / ٥١٤٣٩٥

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة الأردنية (٥٨١٨)

التركيب: يحتوي على ٨٥٠ غرام/كغم من المادة الفعالة Daminozide

فوائد ودواعي الاستعمال:

- ينظم حجم نباتات الزينة عن طريق تقصير وتقليم طول السلاسلات وتقسية وتقوية الأوراق والفروع وزيادة سماكتها.
- يحد من سيادة القفة النامية للنباتات ويشجع نمو الفروع الجانبية.
- ينشط النبات لتكوين البراعم الزهرية والأزهار.
- يقوي النبات ويزيد لونه الأخضر الداكن.
- يقوي الجذور والمجموع الجذري للنبات.

يجب الانتباه إلى الأمور التالية عند رش دازيد على النباتات:

- التوقف عن الري لمدة ٢٤ ساعة بعد الرش.
- عدم الخلط مع أي مادة كيماوية أخرى.
- عدم المتابعة في زيادة تركيز محلول الرش ومراعاة التغطية الجيدة لكافة أجزاء النبات.

تنبيه للمشتري:

إن الشركة الصانعة والمسوقة والبايع غير مسؤولين بأي حال من الأحوال عن أية آثار جانبية أو أضرار ناتجة عن تخزين وتداول واستخدام هذه المادة.

الاستعمالات:

ملاحظات	مواعيد الاستعمال	معدل الاستعمال غرام / لتر ماء	الحصول
يكرر بعدها بعشرة أيام	عندما تكون الأفرع الجانبية بطول ٢ سم	٢,٨	الكريزانثيم (في القوارير)
يكرر بعدها بأسبوعين	قبل البدء بإزالة البراعم الجانبية	٢,٨	الكريزانثيم ذو الزهرة الواحدة (قطف) لكل ساق (قطف)
—	٧ أيام قبل ١٤ يوماً بعد البدء بتقصير طول النهار (التعتيم)	١,٤ - ٠,٧	الكريزانثيم السبري (قطف)
—	عندما يصبح طول الأفرع الجانبية الجديدة ٢-٤ سم	١,٥	البونسيتا (بنت الفصنل)
—	عند مرحلة تكون ٤-٦ أزواج من الأوراق الجديدة	٢,٨	القرطاسية
—	عندما تبلغ النموات الجديدة طول ٢ سم	٢,٨	الأزاليا
—	بعد مرحلة إزالة البرعم الرئيسي	٢,٨	الاجيراتيم وفم السمكة والبتونيا والمنثور والزيتنيا والسلفيا والقدسية

✦ يجب الالتزام بمعدلات الاستعمال المذكورة أعلاه.

دازيد dazide

ENHANCE

fine

الشركة الصانعة:

Fine Agrochemicals Ltd. بريطانيا

Net Content: 1 Kilogram



Made in U.K