


مبيد زراعي سام

إندوفيل م - ٤٥

مسحوق قابل للبلل

(خفيف السمية) **INDOFIL M - 45 80%WP**



احفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال

مبيد فطري زراعي واسع المجال يعمل عن طريق الملامسة
ذو تأثير وقائي على عدد كبير جداً من الأمراض الفطرية
التي تصيب المزروعات

التركيب

مسحوق قابل للبلل يحتوي على ٨٠٪ (وزن/وزن) من المادة الفعالة MANCOZEB	
Ethylenebisdithiocarbamate ion	62%
Zinc	2%
Manganese	16%
INNERT INGREDIENTS	20%

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة الأردنية (١٤٧٩)

Net Contents : 1 Kg.

Mfg. Date :

Exp. Date : 3 Years After Mfg. Date

Batch Number :



الشركة الصانعة : شركة إندوفيل كيميكالز

الوكلاء والموزعون :



شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.

Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.

ص.ب ٨٥١٨٠٥ عمان ١١١٨٥ الأردن

هاتف ٥١٢٨١٣٦ / ٥٥١٤٣٩٥

الإسعافات الأولية :

- * في حالة الابتلاع : يعطى المصاب أقراص الفحم الطبي ويحدث القيء .
لا تحدث القيء لفاقد الوعي . استدعي الطبيب .
- * في حالة الاستنشاق : يجب الابتعاد عن المنطقة الملوثة والانتقال الى مكان جيد التهوية .
- * في حالة ملامسة العينين : يجب غسلها بالماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة واستشارة الطبيب .
- * في حالة ملامسة الجلد : يجب نزع الملابس الملوثة وغسل الجزء الملوث بالماء الدافئ والصابون .

الجرعة المضادة : لا يوجد ، ويعالج المصاب حسب الأعراض

- * مأمون الاستعمال ولا يحدث آثاراً ضاره على المزروعات إذا استعمل حسب التوصيات
- * قابل للخلط مع كافة المبيدات الزراعية المعروفة .

طرق ومعدلات الاستعمال :

(لا ينصح باستعمال هذا المبيد على المحاصيل غير المذكورة على الملصقة)
مع الالتزام بفترات الأمان أثناء عملية القطف)
يستعمل رشاً على الأوراق ولتعقيم البذور /التقاوي حسب التوصيات التالية :

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال لكل ٢٠ ليتر ماء	طريقة الاستعمال	فترة الأمان
البطاطا	اللفحة المبكرة	٥٠ غرام	رشاً على الأوراق	٥ أيام
	عفن الريزكتونيا عفن الفيوزاريوم	٢ كغم / طن تقاوي	معاملة التقاوي قبل الزراعة	-
البندورة الفلفل الباذنجان	اللفحة المبكرة وتبقع الأوراق والانتراكنوز وتغفن الأوراق	٥٠ غرام	رشاً على الأوراق	٥ أيام
القرعيات	البياض الزغبي	٥٠ غرام	رشاً على الأوراق	٥ أيام
الفاصوليا	البياض الزغبي والصدأ والانتراكنوز	٥٠ غرام	رشاً على الأوراق	٥ أيام
البصل والثوم	البياض الزغبي واللفحة	٥٠ غرام	رشاً على الأوراق	٧ أيام
الدخان	البياض الزغبي	٤٠ غرام	رشاً على الأوراق	٧ أيام
أشجار التفاحيات	الجرب	٤٠ غرام	رشاً على الأوراق	٢١ يوم
أشجار اللوزيات (الدراق، المشمش، الكرز)	الجرب	٤٠ غرام	رشاً على الأوراق	٢١ يوم
الحمضيات	الجرب وتبقع الأوراق	٣٠ غرام	رشاً على الأوراق	٢١ يوم
القمح والشعير	امراض الأوراق والسنابل	٢٠٠ غرام/دونم	رشاً على الأوراق	١٤ يوم
	التفحم والصدأ	٢كغم/طن بذور	معاملة البذار قبل الزراعة	-
القرنفل والورد والجلاديوولا والتيلوب ونباتات الزينة	الصدأ وتبقع الاوراق والعفن	٥٠ غرام	رشاً على الأوراق	-

" ينصح بتكرار الرش للوقاية من الأمراض المذكورة أعلاه كل ٧-١٤ يوماً "

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من الرش .

ثبات المبيد : هذا المبيد ثابت على درجة حرارة ٢٥ م لمدة ٢٠ يوم على درجة حموضة ٥ ولمدة ١٧ ساعة على درجة حموضة ٧ ولمدة ٣٤ ساعة على درجة حموضة ٩ .

التحذيرات :

- يحفظ في عبواته الأصلية المحكمة الاغلاق وفي مكان جاف وجيد التهوية وبعيداً عن متناول الأطفال .
- يخزن بعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة .
- قد يسبب تهيجاً للأنف والطلق والجلد .
- لا تستنشق غبار ورذاذ المبيد .
- يجب عدم الأكل والتدخين أثناء عملية الرش .
- تخلص من العبوات الفارغة بدفنها وتجنب تلوين الأنهار والبرك والمياه .
- سام للأسماك .
- غير سام للنحل .

